

**Processo de
Seleção para
o SEHAC
2018**

**Editais 001/2018
Turno: Manhã
Data: 17/02/2019**

Superior

**Médico
Neonatologista**



REALIZAÇÃO:



Língua Portuguesa

Questão 01)

“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de Maricá)

Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque:

- A) Mesóclise.
- B) Prosopopeia.
- C) Próclise.
- D) Metonímia.
- E) Ênclise.

Questão 02)

Indique a frase **INCORRETA** de acordo com a norma culta:

- A) Vitor comprou algumas couves-flores para o restaurante.
- B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro.
- C) O bíceps direito do paciente está distendido.
- D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são muito comuns.
- E) Cuidado com os degraus molhados!

Questão 03)

Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito?

- A) Sinonímia.
- B) Polisssemia.
- C) Hiponímia.
- D) Hipérbole.
- E) Hiperonímia.

Questão 04)

Assinale a alternativa cuja grafia está **INCORRETA**, segundo o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Fiéis.
- B) Paranoico.
- C) Anti-herói.
- D) Feiura.
- E) Container.

Leia o texto a seguir para responder às questões 5, 6 e 7.

“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde.

Foi uma verdadeira calamidade.

Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos caluniados!) foram a explicação que geralmente se deu à singular moléstia da moça.

Três meses correram assim, sem que a doença de Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. Os esforços do médico não podiam ser maiores; de dois em dois dias uma receita. Se a doente se esquecia do seu estado e estava a falar e a corar como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo entregando-se à mais prudente inação.”

(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, setembro de 1875.)

Questão 05)

Qual das informações a seguir está correta de acordo com o texto?

- A) A doença da moça começou a melhorar antes de três meses de tratamento.
- B) O tema central do trecho citado é uma calamidade.
- C) A viuvinha recusava todos os cuidados médicos.
- D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna”, há uma repetição desnecessária do adjetivo.
- E) “Prudente inação” significa um estado de falta de força ou estímulo para atuar em momento de cautela.

Questão 06)

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º e 3º parágrafos):

- I. É defectivo.
- II. Indica fenômeno da natureza.
- III. Não é impessoal.

Estão corretas as afirmações:

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) Apenas I.
- D) Apenas II.
- E) Apenas III.

Questão 07)

Indique a alternativa em que o vocábulo **NÃO** é formado por sufixação:

- A) Verdadeira.
- B) Inação.
- C) Profundamente.
- D) Viuvinha.
- E) Caluniados.

Questão 08)

Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta:

- A) Pretensão, analisar, consiliar.
- B) Excesso, ansioso, siso.
- C) Exceção, preveem, abcesso.
- D) Excesso, torsão, ironizar.
- E) Forceps, empecilho, obcecado.

Questão 09)

Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A opinião do presidente _____ do esperado.
- II. Um _____ pediatra foi demitido.
- III. Muitos comerciais de televisão irritam o _____.
- IV. A _____ de neurologia do hospital estava desfalcada.

- A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador; IV. seção.
- B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador; IV. cessão.
- C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador; IV. sessão.
- D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. seção.
- E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador; IV. cessão.

Questão 10)

Na frase "Dicas **para que** emagreça **mesmo que** coma de tudo", as conjunções destacadas indicam, respectivamente:

- A) Consecução e conformidade.
- B) Causa e condição.
- C) Finalidade e condição.
- D) Causa e conformidade.
- E) Finalidade e concessão.

Conhecimento Específico**Questão 11)**

Recém-nascido a termo apresenta-se, imediatamente após o nascimento, pálido e flácido. Os passos iniciais são adotados, mas permanece flácido, sem respiração espontânea e frequência cardíaca (FC) de 40 bpm. Diante de **NÃO** resposta é adequado instituir:

- A) oximetria de pulso, ventilação através de máscara e balão com oxigênio a 21%;
- B) monitorização cardíaca, ventilação através de cânula e balão com oxigênio a 100% e massagem cardíaca;
- C) oximetria de pulso, monitorização cardíaca e ventilação através de máscara e balão com oxigênio a 21%;
- D) ventilação através de máscara e balão com oxigênio a 100% sincronizada a massagem cardíaca;
- E) monitorização cardíaca, ventilação através de cânula e balão com oxigênio a 21% e massagem cardíaca.

Questão 12)

Recém-nascido submetido à reanimação na sala de parto é transportado para Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN) entubado, ventilado manualmente através de cânula e balão com oxigênio a 100%. Ao exame encontra-se desconfortável, saturação de oxigênio 80% e ausculta pulmonar revelando murmúrio vesicular ausente à direita. Como procedimento de triagem emergencial, nessa situação, deve-se proceder a:

- A) transluminação torácica com fonte luminosa de fibra ótica;
- B) radiografia do tórax;
- C) tração da cânula traqueal e tornar a ventilar;
- D) elevação da pressão positiva do balão;
- E) extubação e reentubar se necessário.

Questão 13)

Recém-nascido, com idade gestacional 33 semanas, durante os cuidados na sala de parto, após o recém-nascido ter sido entubado, foi indicada a ventilação mecânica manual em "T".

Os parâmetros iniciais de ajuste devem ser de fluxo, pressão inspiratória aplicada a cada ventilação (P_{insp}), pressão positiva ao final da expiração (PEEP), frequência respiratória (FR) e concentração de oxigênio, respectivamente de:

- A) 5 a 20 litros/minuto; 15 a 20 cmH₂O; 3-5 cm H₂O; 20-60 mpm; mesma ofertada pré-entubação;
- B) 5 a 15 litros/minuto; 20 a 25 cmH₂O; 4-6 cm H₂O; 40-60 mpm; mesma ofertada pré-entubação;
- C) 5 a 15 litros/minuto; 10 a 20 cmH₂O; 4-6 cm H₂O; 20-40 mpm; 30%;
- D) 10 a 25 litros/minuto; 20 a 25 cmH₂O; 5-8 cm H₂O; 20-40 mpm; 40%;
- E) 15 a 25 litros/minuto; 15 a 25 cmH₂O; 4-8 cm H₂O; 30-60 mpm; 100%.

Questão 14)

O controle de infecção relacionada ao uso do cateter vascular central (CVC) é de extrema importância e para tal é recomendável, seguindo evidências científicas, a adoção da seguinte prática:

- A) utilizar a inserção do CVC através de flebotomia;
- B) utilizar pomadas antimicrobianas no local de inserção do CVC;
- C) realizar cultura da ponta do CVC ao ser removido do paciente;
- D) trocar o set de infusão e dispositivos acoplados ao sistema a cada 48 horas;
- E) cobrir o local de inserção do CVC com curativo estéril de gaze ou transparente.

Questão 15)

O manejo terapêutico do recém-nascido em crise adrenal aguda requer correção urgente de problemas como:

- A) hipovolemia e hipoglicemia;
- B) hiponatremia e alcalose metabólica;
- C) hipocalemia e hipoglicemia;
- D) hipovolemia e alcalose metabólica;
- E) hipocalemia e hiponatremia.

Questão 16)

Recém-nascido, a termo, com 7 dias de vida, em bom estado geral e em aleitamento materno exclusivo é encaminhada para unidade de saúde a fim de iniciar acompanhamento. Mãe informa que o cariótipo fetal indicava 46,XX. O exame da genitália externa revela aumento do clitóris, grandes lábios rugosos e parcialmente fundidos e seio urogenital comum, ao invés de orifícios uretral e vaginal individualizados. Considerando a hipótese de hiperplasia adrenal congênita, a alternativa que mostra a deficiência enzimática mais provável, para o quadro é:

- A) 11- hidroxilase.
- B) 18- hidroxilase.
- C) 21- hidroxilase.
- D) 3-beta – hidroxí-esteróide desidrogenase.
- E) 17-beta – hidroxí-esteróide desidrogenase.

Questão 17)

Recém-nascidos prematuros com Persistência do Canal Arterial **NÃO** estão propensos a maior:

- A) mortalidade;
- B) necessidade de suporte ventilatório;
- C) incidência de hemorragia pulmonar;
- D) ocorrência de broncodisplasia pulmonar;
- E) evidência de edema pulmonar.

Questão 18)

Recém-nascido apresenta quadro clínico de pneumotórax hipertensivo e o diagnóstico está confirmado. É situação de urgência que necessita de intervenção imediata. O local adequado para a punção e drenagem percutânea é o:

- A) quarto espaço intercostal na linha axilar anterior ou segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular;
- B) quarto espaço intercostal na linha axilar anterior ou sexto espaço intercostal na linha axilar posterior;
- C) quinto espaço intercostal na linha axilar anterior ou terceiro espaço intercostal na linha hemiclavicular;
- D) quinto espaço intercostal na linha axilar posterior ou terceiro espaço intercostal na linha axilar anterior;
- E) sexto espaço intercostal na linha axilar posterior ou quarto espaço intercostal na linha axilar anterior.

Questão 19)

Considerando a magnitude das repercussões sobre o conceito a partir de infecções adquiridas pela gestante, faz-se necessário o conhecimento sobre tais afecções e a vigilância permanente sobre essas mulheres. Em relação à infecção pelo vírus Zica podemos afirmar que o período de incubação da infecção nos hospedeiros humanos é de:

- A) 3 a 12 dias;
- B) 5 a 10 dias;
- C) 3 a 7 dias;
- D) 7 a 10 dias;
- E) 7 a 14 dias.

Questão 20)

A atresia das vias biliares extra-hepáticas (AVBEH) constitui a principal causa de transplante hepático em crianças. Sobre essa anormalidade é **INCORRETO** afirmar que:

- A) a poliesplenia constitui-se na anomalia mais frequente;
- B) outras más-formações congênitas podem estar associadas, como as cardíacas;
- C) os ductos biliares estão pèrveos ao nascimento mas por dano perinatal pode ocorrer obliteração da árvore biliar;
- D) a forma embrionária e a perinatal cursam com icterícia precoce, colúria, acolia fecal e hepatomegalia;
- E) o único tratamento disponível é a portoenterostomia (Kasai e Suzuki, 1959) e suas modificações.

Questão 21)

A melhor escolha visando confirmar ou afastar a possibilidade de atresia das vias biliares extra hepáticas em um recém-nascido é:

- A) biópsia hepática;
- B) ultrassonografia ;
- C) cintilografia hepatobiliar;
- D) colangiografia operatória.
- E) tomografia computadorizada

Questão 22)

O ferro é um dos importantes nutrientes para o desenvolvimento cerebral no período fetal tardio e neonatal, sendo requisitado na:

- A) síntese global de neurotransmissores e mielina;
- B) metilação do DNA e metabolismo energético glial;
- C) síntese de DNA e na liberação de neurotransmissores;
- D) síntese de neurotransmissores e atividade antioxidante;
- E) síntese de monoaminas e metabolismo energético neuronal.

Questão 23)

Sobre as crises convulsivas neonatais, os fatores etiológicos mais comuns, na ordem do de maior frequência para o de menor frequência são:

- A) hipóxico-isquêmico – hemorragia intracraniana – infecção do sistema nervoso central;
- B) infecção do sistema nervoso central – isquemia – hemorragia intraventricular;
- C) erros inatos do metabolismo – encefalite – hemorragia intraventricular;
- D) infecção do sistema nervoso central – hipóxico-isquêmico – cromossomopatia;
- E) distúrbios metabólicos – hipóxico-isquêmico – infecção do sistema nervoso central.

Questão 24)

O uso racional de oxigênio suplementar na sala de parto é preconizado em decorrência do conhecimento das variações da saturação da oxihemoglobina nos primeiros minutos de vida. Segundo normativas do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, a saturação do oxigênio, entre o 1º. e o 10º. minutos de vida, entre neonatos saudáveis e a termo, varia de:

- A) 60 a 95%;
- B) 60 a 92%;
- C) 65 a 90%;
- D) 65 a 92%;
- E) 65 a 95%.

Questão 25)

Recém-nascido com 36 semanas de idade gestacional, parto vaginal, mãe febril, 24 horas de bolsa rota e não recebeu antibiótico. Apresenta dificuldade respiratória e hipoatividade desde 3 horas de vida. Realizada triagem para infecção. A hemocultura colhida foi positiva e o germe mais provável é:

- A) estreptococo agalactiae;
- B) estafilococo aureus;
- C) pseudomonas aeruginosa;
- D) estafilococo coagulase negativa;
- E) escherichia coli.

Questão 26)

Recém-nascido de mãe com pré-natal irregular e sorologia VDRL 1:4 na admissão da maternidade. Tem histórico de tratamento nos últimos 30 dias através de duas aplicações de 2400.000 UI de penicilina benzatina em duas semanas consecutivas. Criança apresenta taquipneia leve após o nascimento, hepatoesplenomegalia, periostite no úmero e fêmur. Avaliação líquórica não realizada. VDRL no sangue periférico 1:32. A conduta para essa criança é:

- A) penicilina procaína intramuscular por 7 dias;
- B) penicilina procaína intramuscular por 10 dias;
- C) penicilina cristalina endovenosa por 10 dias;
- D) penicilina cristalina endovenosa por 14 dias;
- E) ceftriaxone endovenoso por 7 dias.

Questão 27)

A administração de soluções adocicadas, por via oral, em recém nascidos, para alívio de dor aguda em procedimentos de rotina nas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais, causam liberação de opióides endógenos os quais possuem propriedades analgésicas intrínsecas. Nesses casos, podemos utilizar, dois minutos antes, na porção anterior da língua:

- A) 1 ml de glicose a 25%;
- B) 2 ml de glicose a 10%;
- C) 4 ml de glicose a 25%;
- D) 1 ml de glicose a 50%;
- E) 2 ml de glicose a 50%.

Questão 28)

Recém-nascido a termo, nasceu bem e foi encaminhado com sua mãe ao alojamento conjunto. Com 24 horas de vida apresentou hipoatividade, vômito e distensão abdominal. Mãe teve tempo de bolsa rota superior a 24 horas. Diante da suspeita de sepse precoce a melhor conduta, dentre as abaixo, para o momento é:

- A) internação na unidade de cuidado intermediário; colhido hemograma; cultura de sangue, líquido e urina; radiografia do abdome e tórax; instalado oximetria de pulso e antibioticoterapia empírica ampicilina com gentamicina; dieta oral zero;
- B) internação na unidade de cuidado intensivo; colhido hemograma; cultura de sangue e líquido; radiografia do abdome e tórax; monitorização cardíaca e oximetria de pulso; antibioticoterapia empírica ampicilina com gentamicina; nutrição parenteral;
- C) internação na unidade de cuidado intermediário; colhido hemograma; PCR; cultura de sangue, líquido e urina; radiografia do abdome e tórax; monitorização cardíaca e oximetria de pulso; antibioticoterapia empírica com cefepime; nutrição parenteral;
- D) internação na unidade de cuidado intensivo; hemograma; PCR; cultura de sangue, líquido; radiografia do abdome e tórax; monitorização cardíaca e oximetria de pulso; antibioticoterapia empírica ampicilina e gentamicina; dieta oral zero;
- E) internação na unidade de cuidado intermediário; hemograma; PCR; VHS; cultura de sangue e líquido; radiografia do abdome e tórax; monitorização cardíaca; antibioticoterapia empírica ampicilina com gentamicina; dieta oral zero.

Questão 29)

Sobre a Retinopatia da Prematuridade (ROP) pode-se afirmar que:

- A) os primeiros sinais de ROP surgem entre a 4ª e a 6ª semana de vida;
- B) os estágios da ROP traduzem a gravidade e são descritos de 1 a 4;
- C) quanto mais anterior (Zona 1) mais grave é a doença;
- D) a doença plus é descrita pela presença de tortuosidade vascular;
- E) quanto mais prematuro for o RN, mais anterior está localizada a ROP.

Questão 30)

Recém-nascido a termo, pesando 2500g, no alojamento conjunto, 3º. dia de vida, bem, sem anormalidades clínicas e em condições de alta da maternidade. Realizado teste da oximetria de pulso ("coraçõzinho") que revelou saturação de oxigênio 92% na mão direita e de 91% no pé direito. A conduta **CORRETA** é:

- A) suspender a alta e iniciar prostaglandina E1 até definição diagnóstica da cardiopatia;
- B) suspender a alta para que seja realizada avaliação ecocardiográfica;
- C) manter a alta e encaminhar para cardiologista pediátrico e ecocardiograma com 1 mês;
- D) suspender a alta, reavaliar o teste em 24 horas e conforme o resultado definir alta;
- E) manter a alta e orientar retorno em 72 horas para reavaliação clínica e ecocardiograma, se necessário.

Conhecimento de Saúde**Questão 31)**

Considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta:

- I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) foram a primeira modalidade de seguro de saúde oferecida no Brasil para a população em geral.
- II – O movimento que originou a Reforma Sanitária brasileira na década de 70 foi impulsionado pela concepção da determinação social da saúde e, por isso, defendia a construção de um modelo de saúde centrado na atenção médica e hospitalar.
- III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço jurídico ao que se refere aos serviços de saúde e às ações para promoção, proteção e recuperação da saúde como direito de todos.
- IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde está inserida em uma lógica de Seguridade Social, em conjunto com as políticas de Previdência e Assistência Social.

- A) I e II estão corretas.
- B) I e III estão corretas.
- C) II e III estão corretas.
- D) II e IV estão corretas.
- E) III e IV estão corretas.

Questão 32)

Considerando aos níveis de prevenção e suas ações, relacione as colunas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

1 - Promoção à saúde.	() Rastreamento de câncer de mama.
2 - Proteção específica.	() Imunização.
3 - Prevenção secundária.	() Reinserção social de portador de transtorno mental.
4 - Prevenção terciária.	() Alimentação adequada.

- A) 3 – 2 – 4 – 1;
- B) 2 – 3 – 1 – 4;
- C) 4 – 1 – 3 – 2;
- D) 3 – 4 – 1 – 2;
- E) 4 – 2 – 3 – 1.

Questão 33)

Considerando princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta:

1 – Integralidade
2 – Equidade
3 – Hierarquização
4 – Regionalização
5 – Descentralização
6 – Universalidade

<input type="checkbox"/>	no Brasil, houve clara opção preferencial pela municipalização da saúde;
<input type="checkbox"/>	a atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos;
<input type="checkbox"/>	quanto mais bem estruturado for o fluxo de referência e contra referência entre os serviços de saúde, melhor a eficiência e eficácia dos mesmos;
<input type="checkbox"/>	é o acesso às ações e serviços de saúde garantida a todas as pessoas;
<input type="checkbox"/>	reconhecer que existem disparidades sociais e regionais, e atuar de forma a minimizá-las;
<input type="checkbox"/>	cada serviço de saúde possui uma área de abrangência e tem responsabilidade sanitária pela saúde daquela população.

- A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3;
- B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4;
- C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;
- D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4;
- E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3.

Questão 34)

Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis de gestão, e são compostas por usuários e gestores;
<input type="checkbox"/>	as Conferências de Saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes;
<input type="checkbox"/>	os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e não deliberativos que fazem parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, estados e do governo federal;
<input type="checkbox"/>	as atividades do Controle Social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS;
<input type="checkbox"/>	o Controle Social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como, as regras de repasse financeiro da federação para os estados e municípios.

- A) V – F – V – F – V;
- B) F – V – V – F – F;
- C) F – V – F – V – F;
- D) F – F – V – V – V;
- E) V – F – V – V – F.

Questão 35)

É possível prover ações e serviços de saúde com garantia de acesso equânime, atenção integral, de qualidade, humanizada e em tempo adequado, através de:

- A) desenvolvimento de serviços especializados de referência;
- B) organização e desenvolvimento das redes de atenção à saúde;
- C) implantação de protocolos internacionais de classificação de risco;
- D) organização de campanhas de prevenção a agravos de saúde;
- E) realização de busca ativa pelas equipes de saúde.

Questão 36)

A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo, e assinale a alternativa correta:

	deve-se notificar a simples suspeita da doença;
	a notificação tem caráter sigiloso;
	a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população não está sob risco;
	os casos de violência contra a mulher que forem atendidos em serviços de saúde, públicos ou privados, podem ser notificados, caso a usuária permita;
	a vigilância epidemiológica e a vigilância em saúde contribuem para o planejamento e a tomada de decisões dos gestores da saúde em nível federal, estadual e municipal.

- A) V – V – F – F – V;
- B) F – V – V – F – V;
- C) F – F – V – V – F;
- D) V – V – F – V – V;
- E) F – V – F – V – F.

Questão 37)

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

- A) inclui a vigilância e o controle das doenças transmissíveis, e não abrange a vigilância de doenças e agravos não transmissíveis;
- B) as emergências epidemiológicas colocam-se em nível de atenção terciária tão somente, em face de sua complexidade;
- C) um importante foco da ação de Vigilância em Saúde está no controle dos agravos por meio do diagnóstico e tratamento das pessoas doentes, interrompendo a cadeia de transmissão;
- D) as ações de Vigilância em Saúde Ambiental abrangem apenas os fatores biológicos do meio ambiente que possam promover riscos à saúde humana, tais como animais peçonhentos e insetos vetores de doenças;
- E) a Vigilância Epidemiológica consiste no conjunto de ações públicas que visam à detecção ou à prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva, excluída a compreensão dos agravos individuais.

Questão 38)

O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de reformas institucionais do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa correta:

- A) redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades dos serviços de saúde, na busca de desonerar os municípios;
- B) a implementação se dá de forma obrigatória para os municípios, estados e união, através do Termo de Compromisso de Gestão, que estabelece metas e compromissos para os municípios, sendo renovado há cada quatro anos;
- C) promove inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior economicidade, descentralização e compartimentalização do Sistema Único de Saúde;
- D) entre as prioridades definidas estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças emergentes e endemias, e a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e da mama;
- E) as formas de transferência dos recursos dos estados e municípios para federação passaram a ser integradas em blocos de financiamento, sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do SUS.

Questão 39)

Considerando a Portaria nº 3.194/2017, que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) promove a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde;
- B) contribui para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde, tendo a Atenção Básica como coordenadora do processo;
- C) fortalece a participação do controle social no setor, de forma a produzir impacto positivo sobre a saúde individual e coletiva;
- D) promove a articulação intra e interinstitucional, de modo a criar compromissos entre as diferentes redes de gestão, de serviços de saúde e educação e do controle social, com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
- E) estimula o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos, impedindo a participação das instituições de ensino.

Questão 40)

Os Sistemas de Informações de Saúde desempenham papel relevante para a organização dos serviços. Analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta:

- I – Os Sistemas de Informações de Saúde possibilitam a avaliação permanente da situação de saúde da população e dos resultados das ações de saúde executadas.
- II – O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornece dados para a análise do perfil da morbidade.
- III – O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados sobre mortalidade no país, de forma abrangente.

- A) I e II estão corretas;
- B) I e III estão corretas;
- C) II e III estão corretas;
- D) Todas estão corretas;
- E) Nenhuma está correta.

INSTRUÇÕES

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta de **40** questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde.
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
 - não haverá substituição por erro do candidato;
 - não deixe de assinar no campo próprio;
 - não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
 - a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;
 - não serão consideradas questões:
 - não assinaladas;
 - com falta de nitidez;
 - com mais de uma alternativa assinalada.
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.
7. Você só poderá retirar-se da sala após **60** minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de **três** horas.
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.

Boa Prova!

✂ =====

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40