



PSIQUIATRA

21. (CONCURSO MAURITI/2018) Em relação aos termos e seus significados psicopatológicos, avalie as seguintes proposições como verdadeiras ou falsas:

- I. Ecopraxia é a repetição automática e despropositada das ações motoras executadas por outra pessoa.
- II. Pareidolia é uma alteração patológica em que uma imagem criada intencionalmente a partir de percepções reais de elementos sensoriais incompletos ou imprecisos
- III. A conação é o conjunto de atividades mentais direcionadas à ação, compreendendo os impulsos e a vontade.
- IV. A alucinação negativa é definida como uma aparente ausência de registro sensorial de determinado objeto presente no campo sensorial do paciente.

Estão corretos:

- A) I, II, III
- B) I, III e IV
- C) apenas I e IV
- D) apenas II e IV
- E) apenas I e III

22. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre a síndrome demencial, assinale a opção correta:

- A) A Demência vascular é mais prevalente em mulheres
- B) A Demência frontotemporal apresenta alucinações visuais precoces,

parkinsonismos, sinais extrapiramidais e flutuação do desempenho cognitivo.

- C) A evolução da Demência Vascular costuma ser em degraus.
- D) Mudanças nas variantes comportamentais, linguísticas e motoras são características da demência por corpos de Lewy.
- E) A Demência de Alzheimer tem início abrupto e deterioração rápida.

23. (CONCURSO MAURITI/2018) Homem, 78 anos de idade, apresenta quadro agudo de agitação psicomotora, confusão mental, flutuação do nível de consciência e alucinações visuais. Qual a conduta?

- A) Administrar benzodiazepínicos para fazer tomografia computadorizada de crânio.
- B) Considerar como evolução natural da doença e administrar benzodiazepínicos.
- C) Administrar antipsicótico de alta potência enquanto se investiga a possível causa da agitação.
- D) Introduzir medicamentos para síndrome demencial (inibidor da acetilcolinesterase)
- E) Prescrever antipsicótico de baixa potência a fim de tranquilizar o paciente.

24. (CONCURSO MAURITI/2018) São características do *delirium tremens* todos os seguintes, exceto:

- A) Confusão mental e tremores
- B) Alucinações visuais e diaforeses.



- C) Hipoatividade autonômica e bradicardia.
- D) Desidratação e distúrbios hidroeletrólitos.
- E) Agitação psicomotora e tremores.

25. (CONCURSO MAURITI/2018) São sintomas negativos da esquizofrenia, exceto:

- A) Pobreza do discurso
- B) Embotamento afetivo
- C) Apatia marcante
- D) Desorganização do pensamento
- E) Lentificação psicomotora

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Em relação ao tratamento da esquizofrenia, podemos afirmar que:

- A) Os antipsicóticos típicos têm ação nos receptores 5HT_{2A}, e, por isso, evoluem com menos sintomas extrapiramidais.
- B) Os antipsicóticos típicos e de alta potência apresentam mais efeitos anticolinérgicos do que os de baixa potência.
- C) A clozapina é mais eficaz porque é mais seletiva no seu antagonismo D₂.
- D) Pacientes em uso de antipsicóticos atípicos devem ser frequentemente avaliados clinicamente por conta dos riscos de síndrome plurimetabólica.
- E) A hiperprolactinemia associada ao uso de antipsicóticos está relacionada o aumento de dopamina na via mesocortical.

27. (CONCURSO MAURITI/2018) Não está presente na hipomania:

- A) Fugas de idéias
- B) Delírios
- C) Insônia
- D) Agitação psicomotora
- E) Loquacidade

28. (CONCURSO MAURITI/2018) O planejamento suicida constitui uma emergência médica e um desafio para serviços de saúde. São fatores que indicam maior risco de consumação do ato suicida, exceto:

- A) Tentativas de suicídio anteriores
- B) Sexo feminino
- C) Comorbidades clínicas
- D) Transtorno por uso de substâncias psicoativas
- E) Histórico de abuso físico e sexual

29. (CONCURSO MAURITI/2018) O transtorno bipolar cursa com elevadas taxas de morbidade e mortalidade e traz prejuízos e custos significativos para seu portador e para a sociedade. São fatores associados com piora do curso deste transtorno, EXCETO:

- A) Baixa adesão ao tratamento medicamentoso
- B) Comorbidades como TDAH e ansiedade
- C) alto nível socioeconômico
- D) eventos de vida negativos
- E) sintomas psicóticos



30. (CONCURSO MAURITI/2018)

Julio, 58a, chega à UPA com alucinações visuais, agitação psicomotora, irritabilidade, tremores grosseiros e insônia. Teve uma crise convulsiva há 4 horas. Nega epilepsia ou outras comorbidades clínicas. Está há 2 dias sem uso de álcool. Segundo a filha, após a morte da esposa, há cerca de 2 anos, passou a ficar mais isolado, triste, chorando com facilidade, desinteressado pelas atividades antes prazerosas. Nega episódios depressivos ou de euforia prévios. Desde então, vem aumentando a quantidade de álcool ingerida, sempre perdendo o controle quando sai para beber. Relata que, sempre que pára a libação alcóolica, apresenta sintomas semelhantes, mas este episódio foi o mais grave.

A partir do caso acima, assinale a afirmativa incorreta quanto à condução deste caso.

- A) Deve-se fazer uso de clorpromazina e prometazina IM para controlar os sintomas psicóticos e diminuir a agitação psicomotora.
- B) É recomendável começar tiamina 100mg IM para evitar a síndrome de Wernicke.
- C) Para tratar a patologia dual, iniciar o uso de um antidepressivo.
- D) Mesmo que o paciente negue comorbidades clínicas, faz-se necessária avaliação clínica e laboratorial.
- E) Iniciar benzodiazepínicos (preferencialmente o lorazepam até 12mg/dia) a fim de diminuir a

excitabilidade cerebral e evitar complicações

31. (CONCURSO MAURITI/2018) O transtorno obsessivo-compulsivo apresenta uma prevalência de aproximadamente 2% ao longo da vida. Com base no DSM-5, são características deste transtorno:

- A) Compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais sem objetivos específicos.
- B) Obsessões se caracterizam apenas por pensamentos.
- C) As compulsões nunca chegam a um grau de serem de excessivas.
- D) O indivíduo não tenta ignorar ou suprimir os pensamentos intrusivos.
- E) Crianças pequenas podem não ser capazes de enunciar os objetivos desses comportamentos ou atos mentais.

32. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o Transtorno do Pânico (TP), assinale a alternativa correta.

- A) Está sempre associado com agorafobia.
- B) Os antipsicóticos atípicos, em baixas doses, constituem o tratamento de primeira escolha para o TP.
- C) Há poucas evidências da importância da psicoterapia para este transtorno.
- D) O tratamento mais eficaz é a associação de psicoterapia com psicofármacos.



E) É raro a ocorrência de ataques de pânico que não sejam relacionados ao TP.

33. (CONCURSO MAURITI/2018) A internação de adolescente com transtornos alimentares (anorexia ou bulimia) é indicada quando:

- A) perda de peso igual a 15%.
- B) ideação suicida sem suporte social.
- C) alteração na mineralização óssea.
- D) corrosão do esmalte dentário.
- E) amenorréia de pelo menos 3 ciclos menstruais consecutivos

34. (CONCURSO MAURITI/2018) Homem, 50a, gerente de banco, sofreu assalto seguido de sequestro dos familiares. Um ano após o ocorrido, ainda apresenta-se tenso, sobressaltado, com lembranças frequentes daqueles momentos, sem conseguir voltar ao local de trabalho onde ocorreu o evento. Qual o tratamento mais indicado:

- A) Inibidor seletivo de receptação de serotonina e benzodiazepínicos
- B) Antipsicóticos e Benzodiazepínicos
- C) Carbonato de Lítio e Antipsicóticos
- D) Inibidor Seletivo de Recaptação de Serotonina e Carbonato de Lítio
- E) Tricíclico e Carbonato de Lítio

35. (CONCURSO MAURITI/2018) Os transtornos de personalidade se referem a um grupo de condições psiquiátricas relacionadas ao desenvolvimento. Sobre as características desses transtornos, assinale a afirmativa correta.

- A) São igualmente distribuídos entre homens e mulheres, inclusive o transtorno de personalidade antissocial.
- B) Caracterizam-se por um padrão de comportamento estável, relacionado à intensificação de padrões culturais e que estão podem ser diagnosticados desde a infância.
- C) Os transtornos do grupo A, pelo DSM-5, apresentam comportamentos de impulsividade, falta de empatia, violação e desrespeito às leis e aos direitos dos outros.
- D) Preocupações exageradas e grande apreço pelas regras, organização e controle caracterizam o transtorno de personalidade evitativa.
- E) A presença de distorções perceptivas é um dos fatores que diferenciam o transtorno de personalidade esquizotípica do transtorno de personalidade esquizóide.

36. (CONCURSO MAURITI/2018) Nos transtornos da sexualidade e do funcionamento sexual, o termo voyeurismo refere-se a:

- A) impulsos ou fantasias sexuais atípicos que causam sofrimento ou prejuízo ao indivíduo ou, eventualmente, a outrem.
- B) tendência persistente a expor os genitais em lugares públicos com intuito de excitação



- C) insatisfação com o próprio sexo biológico e persistente identificação com o sexo oposto.
- D) observação rotineira de pessoas em atividade sexual ou se despindo, o que leva à excitação e à masturbação.
- E) atração por determinada parte do corpo do parceiro e não pelo todo.

37. (CONCURSO MAURITI/2018)
Paciente com acatisia não tem indicação de uso de:

- A) Biperideno
B) Propranolol
C) Clonazepam
D) Clonidina
E) Diazepam

38. (CONCURSO MAURITI/2018) Um menino de 7 anos de idade vem apresentando notas baixas na escola em decorrência de dificuldade de permanecer sentado durante a aula. Não termina suas atividades, é desorganizado com os seus pertences e briga frequentemente com os colegas. Em casa, está sempre se mexendo, fala demais e interrompe os adultos. Os pais dizem que não se concentra para assistir os desenhos e, por vezes, parece que não os escuta. Os sintomas observados ocorrem há cerca de um ano e ele não está em uso de medicação nem apresenta uma doença clínica.

O provável diagnóstico conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de

Transtornos Mentais - DSM-5 e a medicação de primeira escolha para o caso é:

- A) transtorno de ansiedade; benzodiazepínicos
- B) transtorno de oposição desafiante; tricíclicos
- C) transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; metilfenidato
- D) transtorno depressivo; fluoxetina
- E) transtorno psicóticos; risperidona

39. (CONCURSO MAURITI/2018) São fatores de risco para Síndrome Demenciais, exceto:

- A) Sexo feminino
B) Uso de AINE
C) Terapia de reposição estrogênica
D) Uso de estatinas
E) Tabagismo

40. (CONCURSO MAURITI/2018) J.A.S., 20 anos de idade, comemorava haver sido aprovado no vestibular, tendo, na festa de comemoração, ingerido mais bebida alcoólica do que costumava fazer. Apresentou quadro de agitação psicomotora, aos gritos, chegando a tentar agredir os colegas de farra. Foi levado pelos amigos a um Serviço de Emergência. Houve piora do quadro, e a não-aceitação da abordagem dos profissionais que o atendiam. Frente a



este quadro, qual das atitudes abaixo deveria ser tomada?

- A) Realizar contenção mecânica e administrar haloperidol por via intramuscular.
- B) Realizar contenção mecânica e administrar benzodiazepínico por via intramuscular.
- C) Encaminhar para sua residência, aconselhando tomar benzodiazepínico VO, administrar café forte e bastante líquido, até passar a intoxicação.
- D) Aplicar haloperidol e benzodiazepínico por via intramuscular, repetindo as aplicações por via intravenosa cerca de 1 hora após, caso não haja melhora. Repetir as aplicações a cada 2 horas, até a sedação.
- E) Realizar contenção mecânica, administrar clorpromazina e prometazina por via intramuscular.

41. (CONCURSO MAURITI/2018)
Alguns antidepressivos e antipsicóticos apresentam efeito anticolinérgico que se caracteriza pelos seguintes sintomas abaixo, exceto:

- A) Constipação
- B) Taquicardia
- C) Boca seca
- D) Visão turva
- E) Retenção urinária

42. (CONCURSO MAURITI/2018)
Entre os Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina, apresentam menos efeitos na função sexual:

- A) Sertralina
- B) Fluoxetina
- C) Citalopram
- D) Paroxetina
- E) Fluvoxamina

43. (CONCURSO MAURITI/2018)
Paciente do sexo feminino, 27 anos, atendida ambulatorialmente com diagnóstico de transtorno do pânico e epilepsia de longa data. Estava em uso de Fenitoína e foi associado Sertralina 50mg/dia e clonazepam 0,5mg/dia. Evoluiu com remissão dos ataques de pânico. No entanto, retorna ao serviço 3 meses depois referindo recidiva dos ataques de pânico. Refere que a medicação anticonvulsivante havia sido trocada por carbamazepina um mês atrás. Qual a hipótese mais provável?

- A) Crises parciais complexas com sintomatologia autonômica
- B) Indução enzimática pela carbamazepina
- C) Hipotensão postural
- D) Subdosagem da Sertralina
- E) Tolerância ao benzodiazepínico

44. (CONCURSO MAURITI/2018)
Sobre o uso de psicotrópicos na gestação e amamentação, assinale a opção correta.

- A) O uso de paroxetina deve ser evitado no primeiro trimestre de gestação devido ao maior risco de má formação cardíaca no feto.



B) O efeito teratogênico do valproato ocorre tardiamente, entre a 24ª e a 26ª semanas.

C) Riscos como abortamento, malformações, toxicidade neonatal e sequelas neurocomportamentais contraindicam o uso de psicotrópicos na gestação.

D) Na amamentação, a fluoxetina, por apresentar meia-vida mais curta e menor concentração no leite, deve ser o antidepressivo de escolha.

E) O Carbonato de Lítio gera riscos durante a gestação, mas, por não ser excretado no leite materno, é seguro durante a amamentação.

45. (CONCURSO MAURITI/2018) Na avaliação da imputabilidade penal em infratores com transtornos mentais, a legislação penal brasileira utiliza o critério:

- A) Biológico
- B) Psicanalítico
- C) Biopsicossocial
- D) Aquiliano
- E) Biopsicológico

46. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o matriciamento, temos:

- A) ocorre quando o médico da unidade básica de saúde encaminha o paciente para o psiquiatra do CAPS.
- B) atendimento pelo psiquiatra dos pacientes de um território na unidade básica de saúde correspondente.

C) modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica.

D) quando a equipe de saúde mental promove grupos terapêuticos na unidade básica de saúde.

E) atividade de prevenção e promoção de saúde realizada pela equipe de saúde mental.

47. (CONCURSO MAURITI/2018) Estima-se que ao menos um em cada três pacientes fume. Impõe-se, portanto, a abordagem do tabagismo na rotina de trabalho de todos os profissionais de saúde, independente de sua especialidade. Desde que não haja contraindicações, como deve ser o tratamento do transtorno mental por uso de tabaco:

- A) Terapia substitutiva e antidepressivos
- B) Terapia substitutiva e antipsicóticos
- C) apenas antidepressivos
- D) apenas antipsicóticos
- E) apenas benzodiazepínicos

48. (CONCURSO MAURITI/2018) O tratamento do transtorno bipolar (TB) é considerado um desafio na clínica psiquiátrica. Sobre essa questão, assinale a resposta CORRETA:

- A) A associação de antidepressivos e antipsicóticos é recomendada no TB, exceto a combinação fluoxetina-olanzapina.



- B) A monoterapia com topiramato ou gabapentina não é recomendada para o tratamento da mania aguda.
- C) Após a introdução dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, o tratamento do TB não apresenta mais dificuldades.
- D) Não há indicação de eletroconvulsoterapia para o tratamento do transtorno bipolar.
- E) O lítio, apesar de não ser consenso em monoterapia no tratamento da depressão bipolar, pode ser usado por sua propriedade antissuicídio.

49. (CONCURSO MAURITI/2018)
Paciente na faixa dos 27 anos experimentou crise repentina com hiperventilação, taquicardia, sensação de morte iminente, percepção de que irá perder o controle sobre si mesmo. Foi levado ao pronto-socorro cardiológico, que nada constatou em área cardíaca. O diagnóstico mais provável e a melhor proposta terapêutica é:

- A) Transtorno de ansiedade generalizada; Diazepam associado à psicanálise
- B) Transtorno depressivo recorrente; Antidepressivo e benzodiazepínico
- C) Esquizofrenia paranóide; antipsicótico atípico
- D) Transtorno do pânico; antidepressivo, benzodiazepínico e terapia cognitivo-comportamental.

- E) Transtorno obsessivo-compulsivo; clomipramina e antipsicótico em baixas doses.

50. (CONCURSO MAURITI/2018)
Assinale a alternativa incorreta em relação à psicofarmacologia dos ansiolíticos.

- A) Entre as vantagens do clonazepam sobre o alprazolam encontra-se um menor risco de desenvolver fenômenos de supressão menos graves.
- B) O alprazolam é o benzodiazepínico mais importante no tratamento do transtorno misto de ansiedade e depressão.
- C) O clonazepam e o alprazolam são eficazes no transtorno do pânico com e sem agorafobia e fobia social.
- D) A buspirona é um ansiolítico não benzodiazepínico que apresenta potencial de abuso menor que os benzodiazepínicos.
- E) Os benzodiazepínicos clordiazepóxido, diazepam, clobazam e clonazepam são mais utilizados como ansiolíticos por serem medicação de meia vida curta.